

11 * 25.4mm

安舒敏 眼藥水

Anzomin Eye Drops

成分：Each mL Contains：

Antazoline Phosphate.....0.15 mg

Tetrahydrozoline Hydrochloride.....0.5 mg

Chlorhexidine Gluconate.....0.05mg

賦形劑：Boric Acid, Sodium Borate, Hydrochloric Acid, Distilled Water

藥理作用：

Anzomin是由抗敏感劑Antazoline與血管收縮劑Tetrahydrozoline所調製而成。Antazoline (抗組織胺)能廣泛地解除眼睛過敏的症狀，並因其具有抗黏膜充血作用，因此能很迅速地消除眼睛的紅絲。Tetrahydrozoline使微血管產生收縮作用，所以治療眼睛紅腫效果良好。

綜合上述兩種成份的作用，本劑能對眼前瞼所受刺激產生迅速及長效性的舒暢，並能治療眼睛的過敏。

適應症：眼睛疲勞、刺激性過敏、眼睛過敏、結膜炎、結膜充血。

用法用量：

每天3~4次，每次1~2滴，滴於眼結膜囊內。

本藥須由醫師處方使用。

禁忌：下列情況及禁忌症

對此藥某種成分過敏、乾性鼻炎、隅角封閉性青光眼、兩歲以下孩童、患有嚴重心血管疾病、內分泌異常、還有接受單胺氧化酶抑制劑，及使用升壓藥物的病人，應遵照醫師指示服用。

副作用：

- 1.偶爾會有結膜充血，乾燥及灼熱感，及全身性反應。
- 2.Tetrahydrozoline這種成份眼藥水，可能會導致暫時視力模糊、結膜的刺激，或是少部分會有瞳孔放大情形。
- 3.特別注意新生兒，三歲以下小孩使用過量，(eg.吞食)一旦意外吞食請立即找醫師，過量使用會導致心臟機能障礙。

注意事項：

- 1.本劑應置於小孩伸手不及處。
- 2.開瓶注意事項：產品於開啓使用前，先以順時針方式往下旋緊一圈後再逆時針旋開瓶蓋使用，以利藥液滴出。
- 3.於保管時，若容器的前端和蓋子出現結晶，請以乾淨的紗布擦拭後使用。

貯存：貯存於25°C以下，並應防止光線照射。

開瓶後超過一個月，請丟棄勿用。

包裝：100毫升以下塑膠瓶裝。

衛署藥製字第048471號



委託者：麥迪森醫藥股份有限公司
製造廠：麥迪森醫藥股份有限公司 桃園廠
桃園市桃園區桃鶯路445-2號
ASEPTIC INNOVATIVE MEDICINE CO., LTD.
No.445-2, Taoying Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C)

5A29®