

“麥迪森”特百欣 眼藥水0.3%

Tobacin Eye Drops 0.3% “MEDICINE”
(Tobramycin)

【成份】

Each mL contains:

Tobramycin.....3.0mg

賦形劑：Boric Acid, Sodium Sulfate, Benzalkonium Chloride, Sodium Chloride, Distilled Water

【藥效】

Tobramycin是水溶性Aminoglycoside的抗生素，廣泛的對於革蘭陰性及革蘭陽性病原菌發生效力。經過試管試驗結果證實對於下列各種微生物產生效果：

1. 葡萄狀球菌：包括S.aureus和S.epidermidis(旋固黴陽性菌，包括對Penicillin有抗性之葡萄狀球菌)。
2. 綠膿桿菌、大腸桿菌、肺炎桿菌、好氣性大腸桿菌、奇異變形桿菌(Indole-negative)及變形桿菌屬(Indole-positive)、流行性感冒嗜血菌、H.aegyptius Moraxella Lacunata 及 Acinetobacter calcoaceticus(Herellea vaginacola)。
3. 細菌感應試驗證實對Gentamicin有抗性的一些微生物也對Tobramycin呈現感應，目前尚未發現抵抗Tobramycin的重要性菌屬，但長期使用可能會引起抗性細菌。

【適應症】

1. 眼睛感染及眼附屬器官的感染。
2. 對於一般抗生素有抗性的細菌感染。

【禁忌】

對於本藥品各成份有過敏的病患，禁用本藥品。

【警告】

1. 本藥品不得注射於眼睛內。
2. Aminoglycosides對於特異體質病患可能引起過敏。
3. 如果發生過敏現象，應立即停止使用本藥品。
4. 本藥品和一般抗生素一樣，長期使用可能會引起抗性的微生物，包括黴菌。
5. 如果超感染病發生，應有妥當治療之準備。
6. Tobramycin的成分之一Tyloxapol不能與Tetracyclines藥品併用。
7. 孕婦：以常人用量33倍之Tobramycin投用於三種不同的動物證實：Tobramycin對胎兒沒有不良影響，但尚未適當的試驗用於孕婦。由於動物試驗並不能代表人體之反應，如妊娠期間應於非用不可的情況下使用之。
8. 授乳婦：為避免受哺乳之嬰兒引起副作用，先決條件必須決定停止哺乳或停止投與Tobramycin，並考慮對母體之重要性。

【副作用】

1. Tobacin眼藥水最普遍的副作用在對於眼睛局部的毒性及過敏，包括眼瞼搔癢、水腫，以及結膜發紅。100位病患中不到三人(3%以下)可能會發生這樣的副作用。一般Aminoglycosides抗生素藥品都會發生同樣的副作用。
2. 其它副作用尚未發現於Tobacin眼藥水之投與，但如將Tobramycin眼藥水與其它類Aminoglycosides藥品併用時，應注意其血清濃度之總量。

【用藥過量】

超過用藥量對於一些病患可能引起上列副作用(例如點狀角膜炎、紅腫、淚水增加、水腫及搔癢)。

【用法用量】

1. 輕度至中度病況：每4小時點1-2滴於感染的眼睛。
2. 嚴重病況：每小時點2滴至明顯見效為止，其後即減少用量，使用至完全治癒為止。
3. 臨床試驗證實Tobramycin可用於孩童。
4. 本藥須由醫師處方使用。
5. 開瓶注意事項，產品於開啟使用前，先以順時針方向往下旋緊一圈後再逆時針旋轉開瓶使用，以利藥液滴出。
6. 於保管時，若容器的前端和蓋子出現結晶，請以乾淨的紗布擦拭後使用。

【包裝】

100 mL以下塑膠瓶裝。

【儲存】

請儲存於25°C以下，避光，不要置於高溫度環境或冰箱中，瓶蓋應蓋緊。
須置於小孩接觸不到之處。

衛署藥製字第055260號

委託者：麥迪森醫藥股份有限公司

台北市中正區林森南路十號五樓

製造廠：麥迪森醫藥股份有限公司 桃園廠

桃園市桃園區桃鶯路445-2號

ASEPTIC INNOVATIVE MEDICINE CO.,LTD.

No.445-2, Taoying Rd,Taoyuan Dist, Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C.)

