

“麥迪森”雅托平 眼藥水
Tropine Eye Drops 0.3% “MEDICINE”
(Atropine Sulfate)

【作用機制】

Atropine 會阻止虹膜括約肌的膽激素作用和負責調節的睫狀肌作

用。

會產生瞳孔散大：散瞳。

可使睫狀肌調節功能麻痺：睫狀肌麻痺。

【成分】

Each mL contains :

Atropine Sulfate.....3mg

賦形劑 : Hydroxypropylmethylcellulose 606, Benzalkonium Chloride,
Sodium Chloride, Boric Acid , Sodium Borate, Hydrochloric Acid,
Distilled Water

【適應症】

散瞳、睫狀肌麻痺。

【用法用量】

本藥須由醫師處方使用。

通常一次1~2滴，一天2~4次，視症狀酌予增減。

【注意事項】

對有青光眼或有導致狹角性青光眼傾向之患者禁止使用本品。

避免連續使用，慢性青光眼患者使用後須作追蹤檢查。前列腺患者使用要注意。

【副作用】

一般性過量時：喉嚨乾燥、發燒、刺痛、心跳加快、臉紅、便祕、年紀大者會精神恍惚、長期散瞳。

【警語】

使用後會產生視力模糊，應避免駕駛汽機車。

【過量時】

在使用過量的情形，特別是小孩意外吸收到點眼液，會有膽妄以及痙攣現象。

給與每劑量1mg毒扁豆鹼，經由靜脈注射，直到症狀好轉。

【其他注意事項】

1.於保管時，若容器的前端和蓋子出現結晶，請以乾淨的紗布擦拭後使用。

2.開瓶注意事項:產品於開啓使用前，先以順時針方式往下旋緊一圈後再逆時針轉開瓶使用，以利藥液滴出。

【儲存】

請儲存於25°C以下，並避免陽光及日光燈直射，不要置於高溫度環境或冰箱中，瓶蓋應蓋緊。

須置於小孩接觸不到之處。

【包裝】

100mL以下塑膠瓶裝。

衛署藥製字第048251號



委託者：麥迪森醫藥股份有限公司
製造廠：麥迪森醫藥股份有限公司 桃園廠
桃園市桃園區桃鷺路445-2號
ASEPTIC INNOVATIVE MEDICINE CO., LTD.
No.445-2, Taoying Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C.)

5A04 ⑤