

“麥迪森” 亞妥明眼藥水0.025% “AIM” Atropine Eye Drops 0.025%

衛部藥製字第061879號
須由醫師處方使用

本品不含防腐劑，不產生交互感染，是一種無菌使用於眼部之局部抗膽鹼劑。

1. 性狀

1.1 有效成分及含量

每mL中含有Atropine Sulfate 0.25mg

1.2 賦形劑

Sodium Chloride、Sodium Phosphate Monobasic Dihydrate、
Hydrochloric Acid、Purified Water

1.3 劑型

眼用液劑。

1.4 藥品外觀

透明澄清無色溶液。

2. 適應症

散瞳及睫狀肌麻痺。

3. 用法及用量

3.1 用法用量

通常一次1~2滴	一天1~4次
----------	--------

視症狀酌於增減，限由醫師處方使用。

4. 禁忌

- 4.1 有青光眼或有導致狹角性青光眼傾向之病人禁止用本品。
- 4.2 曾因本藥成分引起過敏的人請勿使用本藥。

5. 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

- 5.1.1 過量使用於小孩或對特定成分過敏者，可能會產生全身中毒症狀，應停止使用並以適當藥物治療，參見【過量】段落。
- 5.1.2 使用後會產生視力模糊，應避免駕駛汽機車。
- 5.1.3 本藥為可回蓋式(re-cap)不含防腐劑拋棄式小包裝眼藥水，需於24小時內使用完畢。
- 5.1.4 使用前，請洗淨雙手。

6. 特殊族群注意事項

6.1 懷孕

Atropine Sulfate尚未有動物生殖研究，目前尚未清楚局部Atropine Sulfate是否會對胎兒造成傷害或影響生殖能力。僅當清楚需要時，本品可應用於孕婦。

6.4 小兒

請參見禁忌和警語及注意事項段落。

7. 交互作用

目前尚無資訊。

8. 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

使用時，可能會產生畏光及近距離調節作用不足之現象。曾有發生眼瞼過敏反應、局部刺激、充血、腫大、結膜濾泡增殖炎或皮膚炎的報告。

9. 過量

全身性atropine中毒症狀，包括臉部潮紅、皮膚乾燥(小孩可能會出現紅疹)、視力模糊、心跳加快與心跳不規律、發燒、腹脹、便秘、譫妄、神經肌肉不協調、年紀大者會精神恍惚、長期散瞳。如有過量現象，應使用水或0.9%生理食鹽水沖洗。如意外攝取(吞食)時，可使之嘔吐或洗胃，必要時需全身支持措施和靜脈注射毒扁豆鹼(physostigmine)治療。

10. 藥理特性

10.1 作用機轉

目前尚無資訊。

10.2 藥效藥理特性

目前尚無資訊。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11. 藥物動力學特性

目前尚無資訊。

12. 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

13. 包裝及儲存

13.1 包裝

0.5mL LDPE瓶裝。

13.2 效期

2年

13.3 儲存條件

13.3.1 請儲存於25°C以下，避免陽光及日光燈直射。

13.3.2 需置於小孩接觸不到之處。

製造廠

麥迪森醫藥股份有限公司桃園廠	桃園市桃園區桃鶯路445之2號
----------------	-----------------

藥商

麥迪森醫藥股份有限公司	臺北市中正區林森南路10號5樓
-------------	-----------------