

阿米巴療癒眼藥水

CHG Eye Drops 0.02% (Chlorhexidine Gluconate)

【成分】

每 ml 中含：Chlorhexidine Gluconate 20%.....1 mg
賦形劑：Sodium Acetate 3H₂O、D-Mannitol、Acetic Acid、Distilled Water

【性狀】

本藥為無色透明水性眼藥水，pH 值為 5.0~7.5，滲透壓比約 1 左右。

【適應症】

棘狀阿米巴角膜炎

【用法·用量】

本藥須由醫師處方使用

急性期強化治療：

- (1) 用 **CHG** Eye Drops 0.02%，晝夜每小時 1 次局部點藥，連續 48~72 小時。
- (2) 第 4~7 天，白天每 2 小時、夜間每 4 小時用藥 1 次。

維持期治療：

- (1) 每 4 小時用藥 1 次，3 周後結合臨床情況逐漸減少用藥次數。
- (2) 2 個月後，2~4 次/天，療程應該超過 6 個月。

【注意事項】

- (一) 為防止兒童誤食請妥善保管。
- (二) 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- (三) 使用前，請洗淨雙手。
- (四) 請依照藥品標示使用。
- (五) 過期眼藥水，請勿使用。瓶裝之眼藥水，開瓶 28 天(四週)後，請勿繼續使用。
- (六) 藥液混濁、變色或出現異物時請丟棄。
- (七) 為避免污染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口，並避免與他人共用，或以其他容器承裝。
- (八) 如需同時使用兩種眼藥時，請依下列方式使用，以免影響藥效：
 1. 使用眼藥水與眼藥膏時，請先使用藥水，間隔 10 分鐘以上再用藥膏。
 2. 使用兩種眼藥水時，建議間隔 5 分鐘以上。
- (九) 配戴隱形眼鏡時，請勿點用本藥。

【警語】

對眼用製劑之主要成分或賦形劑過敏者，不推薦使用。

【儲存】

避免陽光、日光燈直射，室溫 25 °C 保存。
須置於小孩接觸不到之處。

【包裝】

100 ml 以下塑膠瓶裝。



麥迪森醫藥股份有限公司
公司：臺北市中正區林森南路10號5樓
桃園廠：桃園市桃園區桃鶯路445-2號