

尺寸：11 \* 25.4公分

## “麥迪森”倍特明眼藥水 0.1%

### Betame Eye Drops 0.1% “MEDICINE”

(Betamethasone Sodium Phosphate)

#### 【組成・性狀】

成分・含量：Betamethasone Sodium Phosphate 1mg/mL  
性狀・劑型：無色透明液，無臭(無菌製劑)  
賦形劑：EDTA-2Na, Sodium phosphate dibasic 12H<sub>2</sub>O,  
Sodium phosphate monobasic 2H<sub>2</sub>O, Sodium chloride,  
Bezalkonium chloride, Distilled water

#### 【適應症】

眼瞼炎、結膜炎、角膜炎、鞏膜炎、虹彩炎等之炎症性眼科疾患。

#### 【用法・用量】

本藥須由醫師處方使用。  
通常每日點眼 3~4 次，每次 1~2 滴，得視症狀適宜增減。

#### 【效能・效果】

1. 眼科  
外眼部及前眼部炎症疾患之對症療法(眼瞼炎、結膜炎、角膜炎、鞏膜炎、上鞏膜炎、前眼部葡萄膜炎、手術後炎症)。
2. 耳鼻科  
外耳、中耳(含耳咽管)或上呼吸道炎症性、過敏性疾患(外耳炎、中耳炎、過敏性鼻炎等)，手術後處置。

#### 【注意事項】

1. 禁忌(下列患者請勿使用)  
曾對本劑過敏之患者。
2. 下列患者以不使用為原則，若不得已需使用時，應慎重使用：  
(1) 角膜上皮剝離或角膜潰瘍患者(此類疾患會有病情惡化的情形)。  
(2) 病毒性結膜、角膜疾患，結核性眼部疾患，黴菌性眼部疾患患者(此類病患會有病情惡化的情形)。  
(3) 鼻腔結核性或病毒性疾患患者(此類病患會有病情惡化的情形)(用於耳鼻咽喉科時)。
3. 慎重投與(下列患者請慎重使用)  
糖尿病患者(可能會有糖尿病惡化的情形)
4. 副作用  
再評估結果中，安全性評估對象 261 例，發生副作用有 3 例 (1.1%)。  
發現頻率(罕有<0.1%，偶有0.1~<5%)  
(1) 重大副作用  
眼部  
1) 青光眼：連續使用數週後，偶有眼壓升高，又罕有青光眼等現象，應定期實施眼內壓檢查。  
2) 有時會誘發角膜疤痕、角膜黴菌症、綠膜桿菌感染等副作用，有此情形發生時，應即做適當處置。  
3) 穿孔：使用於角膜疤痕、角膜潰瘍或外傷時可能有穿孔的情形。  
4) 繼發性白內障：長期使用，罕有繼發性白內障之情形發生。  
(2) 其他副作用  
1) 過敏症：罕有刺激感等情形發生，有此類症狀發生時，應即停藥。  
2) 耳、鼻：可能有誘發耳或鼻局部化膿性感染(用於耳鼻咽喉科時)。  
3) 創傷癒合之遲延：有時會遲延創傷之癒合。  
4) 腦下垂體、腎上腺皮質系機能：長期使用，會導致腦下垂體、腎上腺皮質機能之抑制。  
5) 其他：使用本劑時，雖出現與全身使用時相同之副作用極為罕見，但仍請避免長期連續使用。

#### 5. 高齡者之投與

高齡患者一般因生理機能減退，故應考慮減量使用的必要性。

#### 6. 孕婦、產婦、授乳婦等之投與

懷孕或可能懷孕之孕婦請避免長期或高頻率使用。(懷孕使用的安全性尚未確立)

#### 7. 小兒之投與

早產兒、新生兒、乳兒、幼兒或小兒的安全性尚未確立，特別是未滿兩歲者應慎重使用。

#### 8. 於保管時，若容器的前端和蓋子出現結晶，請以乾淨的紗布擦拭後使用。

#### 9. 開瓶注意事項產品於開啓使用前，先以順時針方式往下旋緊一圈後再逆時針轉開瓶使用，以利藥液滴出。

#### 【藥效藥理】

Betamethasone Sodium Phosphate 係一種合成醣質腎上腺皮質荷爾蒙劑，具抗炎症作用、抗過敏作用。

#### 【有效成分之理化學特性】

一般名：Betamethasone Disodium Phosphate

化學名：Disodium 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-phosphate

分子式：C22H28FNa2O8P

分子量：516.40


性 狀：白色~微黃白色結晶性無臭粉末或塊狀。

本品易溶於水，略溶於Methanol，微溶於Ethanol(95)，幾不溶於Diethylether。

具吸水性。

熔 點：約213°C(分解)。

構造式：



#### 【儲 存】

1. 請儲存於 25°C 以下，並避免陽光及日光燈直射，不要置於高溫度環境或冰箱中，瓶蓋應蓋緊。

2. 須置於小孩接觸不到之處。

#### 【包 裝】

100毫升以下塑膠瓶裝。

衛署藥製字第 057832 號

委託者：麥迪森醫藥股份有限公司

台北市中正區林森南路十號五樓

製造廠：麥迪森醫藥股份有限公司 桃園廠

桃園市桃園區桃鶯路445-2號

ASEPTIC INNOVATIVE MEDICINE CO., LTD.

No.445-2, Taoying Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C)

5A30④

