

# 水潤澤眼藥水

## Moisture Eye Drops

衛部藥製字第061517號  
醫師藥師藥劑生指示藥品

### 疲勞退散眼睛更健康

- 眼睛疲累感/隱形眼鏡異物感...產生眼睛不適感。
- 水潤澤眼藥水含有可緩解疲勞緊繩甲基硫酸新斯的明(Neostigmine Methylsulfate)和維生素B<sub>12</sub>的最高濃度配方，以及促進新陳代謝的最高濃度維生素B<sub>6</sub>配方。
- 等滲配方，增加眼睛舒適度。
- 不含防腐劑眼睛更健康，裸眼及配戴隱形眼鏡\*皆可使用。  
\*請在眼科醫生的指導下使用隱形眼鏡鏡片(包括彩色美瞳鏡片)，並定期檢查更換。

### 1.成分

#### 1.1. 有效成分及含量

Each mL contains :

Cyanocobalamin (Vit B12).....0.2 mg  
Neostigmine Methylsulfate.....0.05 mg  
Pyridoxine Hydrochloride.....1.0 mg

#### 1.2. 其他成分(賦形劑)

Boric Acid、Potassium Chloride、Sodium Chloride、Sodium Hydroxide (pH值調整劑)、Distilled Water

### 2.用途(適應症)

眼睛疲勞。

### 3.使用上注意事項

#### 3.1 有下列情形者，請勿使用

對本品中任一成分過敏者。

#### 3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

正在接受醫師治療或醫師處方眼藥的人。

#### 3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。

3.4.2 避免陽光直射。

3.4.3 使用前，請洗淨雙手。

3.4.4 請依照藥品標示使用。

3.4.5 以下情形，請勿繼續使用:

3.4.5.1 超過保存期限的眼藥水。

3.4.5.2 藥液混濁、變色或出現異物時。

#### 3.5 須於24小時內使用完畢。

3.6 為避免污染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口，並避免與他人共用，或以其他容器盛裝。

#### 3.7 如需同時使用兩種以上眼藥時，請依下列方式使用，以免影響藥效：

3.7.1 使用眼藥水與眼藥膏時，請先使用藥水，間隔10分鐘以上再用藥膏。

3.7.2 使用兩種眼藥水時，建議間隔5分鐘以上。

3.8 配戴隱形眼鏡時，請勿使用含防腐劑及含懸浮液之眼藥水。

### 4.用法用量

一天3至4次

每次1~2滴

**5.警語**

- 5.1 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治。
- 5.1.1 連續使用三天症狀沒有改善。
- 5.1.2 使用後產生眼睛劇痛、持續視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。
- 5.1.3 若有任何不適情況產生。

**6.包裝**

100mL以下LDPE塑膠瓶裝。

**7.儲存方式**

25°C 以下儲存。

**8.儲存注意事項**

- 8.1. 使用後必須密閉，置於陰涼處。
- 8.2. 為防止兒童誤食請妥善保管。

**9.效期**

2年(未開封狀態)



**製造廠**

麥迪森醫藥股份有限公司桃園廠	桃園市桃園區桃鶯路445之2號
----------------	-----------------

**藥商**

麥迪森醫藥股份有限公司	臺北市中正區林森南路10號5樓
-------------	-----------------